



VIH/SIDA y Otras Enfermedades de Transmisión Sexual en Perú

**Resultados de la Encuesta
Demográfica y de Salud Familiar
Perú 2000**

VIH/SIDA y Otras Enfermedades de Transmisión Sexual en Perú

**Resultados de la Encuesta Demográfica
y de Salud Familiar
Perú 2000**

Instituto Nacional de Estadística e Informática
Lima, Perú

ORC Macro
Calverton, Maryland, USA

Junio 2002

Se sugiere citar el documento de la siguiente manera:

Instituto Nacional de Estadística e Informática [Perú] y ORC Macro. 2002. *VIH/SIDA y Otras Enfermedades de Transmisión Sexual en Perú: Resultados de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar, Perú 2000*. Calverton, Maryland, USA: ORC Macro

Para información adicional sobre el programa DHS favor dirigirse:

Programa DHS
ORC Macro
11785 Beltsville Drive
Calverton Maryland 20705 USA
Teléfono: (301) 572-0200
Telefax: (301) 572-0999
e-mail: reports@macroint.com; internet: www.measuredhs.com

Para información adicional sobre la encuesta del 2000 y otras encuestas en Perú favor dirigirse a:

Instituto Nacional de Estadística e Informática
Av. General Garzón No 658
Jesús María, Lima 11
Perú
Teléfono: (511) 433-8284/433-3104
Fax: (511) 433-3159

Introducción

Este informe sobre VIH/SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual en Perú fue preparado para la *XVI Conferencia Internacional sobre el SIDA* que se lleva a cabo en julio de 2002 en Barcelona, España. El texto proviene del informe final de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar, Perú 2000 (ENDES 2000).¹

La ENDES 2000 (o ENDES IV), es una investigación desarrollada por el INEI a solicitud del Ministerio de Salud en el marco de la fase IV del Programa Mundial de Encuestas de Demografía y Salud DHS, ahora conocido como MEASURE DHS+. Su fin principal fue proporcionar, a quienes diseñan y administran programas de salud y de planificación familiar y otro tipo de programas de carácter social, información actualizada para el país y sus departamentos, sobre los niveles actuales de fecundidad y mortalidad infantil, conocimiento y uso de métodos de planificación familiar y fuentes de obtención de los métodos, salud materno infantil, nutrición, SIDA y violencia doméstica. La información obtenida en la ENDES 2000 es comparable con la proveniente de otras fuentes como las Encuestas Demográficas y de Salud Familiar de 1986, 1991-92 y 1996, para examinar tendencias en la mayoría de las variables que se estudian.

La ENDES 2000 está básicamente constituida por dos encuestas: una encuesta de hogares y una encuesta individual para recolectar información sobre las mujeres de 15 a 49 años de edad y sus hijos menores de 5 años, realizadas en una muestra probabilística, de áreas, estratificada, multi-etápica e independiente en cada departamento del país. En una submuestra de la ENDES 2000, a todas las mujeres y a los niños menores de 5 años se les realizó una prueba de hemoglobina para el estudio de los niveles de anemia.

La operación de campo de la ENDES 2000 se realizó entre 18 de julio y el 22 de noviembre del 2000, habiéndose completado en total 28,900 entrevistas de hogares y 27,843 entrevistas individuales a mujeres en edad fértil. Fueron pesados y se tomó la talla a 10,477 niños; y, se realizó la prueba de hemoglobina a 6,184 mujeres y 2,150 niños menores de cinco años de edad.

Los resultados se pueden analizar a diferentes niveles de desagregación: por área de residencia, nivel de urbanización, regiones naturales y por departamentos (24 en total).

La encuesta fue financiada principalmente por la Misión en Perú de la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID/Perú). El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF también contribuyó en su financiamiento. El programa DHS de ORC Macro proporcionó la asistencia técnica bajo contrato con USAID/Washington.

¹ Instituto Nacional de Estadística e Informática [Perú] y ORC Macro. 2001. *Encuesta Demográfica y de Salud Familiar, Perú 2000*. Calverton, Maryland, USA: Instituto Nacional de Estadística e Informática y ORC Macro.

En la mayoría de los países en desarrollo, las enfermedades de transmisión sexual (ETS) ocupan el segundo lugar entre las causas de enfermedad de las mujeres en edad reproductiva, después de las relacionadas con la maternidad. Si se incluyen las relacionadas con el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), esas enfermedades representan casi el 15 por ciento de las muertes. Los grupos más susceptibles son las mujeres, especialmente las jóvenes y la mayoría de las ETS son infecciones del aparato reproductivo.

Si bien el SIDA es de reciente aparición en el Perú, se estima que más de 100,000 personas estarían infectadas con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) en el año 2,000. La magnitud del problema, la rápida propagación del VIH/SIDA, la no existencia de cura para la enfermedad y la relación entre ETS e infección por VIH confirman la importancia de monitorear el conocimiento de la población sobre el problema, la percepción de los riesgos y formas de transmisión y prevención.

El impacto individual, social y económico de la infección VIH/SIDA la convierte en la peor epidemia de la era moderna, pues en un futuro próximo no existirán presupuestos públicos capaces de proveer insumos, equipos y personal necesarios para atender a los enfermos con las complicaciones propias del estadio SIDA.

Por esas y otras razones, el cuestionario individual de la **ENDES 2000** incluyó una sección para indagar sobre el conocimiento general de las mujeres acerca de las enfermedades transmitidas sexualmente: conocimiento de las distintas enfermedades, si han adquirido enfermedades en los doce meses anteriores a la encuesta y, si lo estuvieron, lugar y persona donde buscó tratamiento o consejo, comunicación con el compañero sexual. Con relación al SIDA, cual fue la principal fuente de información en el caso de haber oído hablar de la enfermedad, qué debe hacerse para evitar contraer el SIDA, si una persona puede tener la enfermedad aunque parezca saludable, y si cree que el virus del SIDA puede ser transmitido de una madre infectada al niño y en que momento.

Igualmente se les pidió a las mujeres opinar sobre los derechos de las personas infectadas por SIDA a trabajar o llevar una vida en comunidad. También se hicieron preguntas sobre la conducta sexual en los últimos 12 meses (número y tipo de parejas sexuales y uso del condón).

1.1 CONOCIMIENTO DE VIH/SIDA Y FORMAS DE EVITAR EL CONTAGIO

A las mujeres se les preguntó si habían oído hablar de la infección por VIH y de una enfermedad llamada SIDA. A quienes respondieron afirmativamente se les preguntó de cuál fuente de información aprendió más sobre el SIDA y si había algo que una persona puede hacer para evitar infectarse con el virus. También se les preguntó si pensaban que su riesgo de adquirir SIDA era alto, moderado, mínimo o si no tenían ningún riesgo. Los resultados generales se presentan en el Cuadro 1.1, mientras que en el Cuadro 1.2 se presentan en forma detallada las fuentes de conocimiento. El conocimiento de formas específicas de evitar el SIDA se incluyen en el Cuadro 1.3 mientras que el Gráfico 1.1 resume los resultados. El Cuadro 1.4 contiene la percepción de la entrevistada de su riesgo de contraer el SIDA.

Cuadro 1.1

Conocimiento de VIH/SIDA (Cuadro 1.1)

- El 87 por ciento del total de mujeres entrevistadas en el país declaran haber oído hablar de la infección por VIH o de la enfermedad llamada SIDA: 25 por ciento lo conoce pero no sabe como evitarlo y 63 por ciento de las entrevistadas conoce alguna forma válida de evitar infectarse con esta enfermedad.
- El desconocimiento de la existencia del VIH/SIDA es más frecuente entre las mujeres sin educación, segmento poblacional donde 6 de cada 10 mujeres entrevistadas no ha oído hablar de la infección por VIH o de la enfermedad llamada SIDA, sin considerar que de las cuatro que han oído hablar de la enfermedad cerca de dos

no conoce forma alguna de evitar infectarse.

- Según el lugar de residencia, el desconocimiento de la existencia del VIH/SIDA es más frecuente entre las mujeres que residen en la región natural de la sierra, en el área rural y en los departamentos de Cusco, Huánuco, Cajamarca, Puno, Apurímac y Huancavelica, donde más del 30 por ciento de las mujeres entrevistadas no han oído hablar del VIH/SIDA.

Conocimiento de alguna forma de evitar contagio del SIDA (Cuadros 1.1 y 1.2)

- Sólo el 63 por ciento de las mujeres entrevistadas conoce alguna forma válida de evitar infectarse con el VIH/SIDA: 44 por ciento una forma válida y 19 por ciento dos o más formas válidas.
- Entre las formas válidas más conocidas para evitar el VIH/SIDA destacan "limitando el número de compañeros sexuales" y "mediante el uso del condón", las que son identificadas por el 38 y 33 por ciento de las mujeres en edad fértil, respectivamente. Entre otras formas, también destaca "no compartir jeringas o navajas" (23 por ciento). Evitar comportamientos de riesgo como el de tener sexo con prostitutas o con homosexuales, fueron enunciadas por menos del 6 por ciento de las entrevistadas.
- La prevención del VIH/SIDA "limitando el número de compañeros sexuales" es más frecuente entre las mujeres de 25-29 (43 por ciento), entre las mujeres con educación superior y entre las mujeres que residen en el área urbana, particularmente entre las mujeres de Lima Metropolitana y entre las residentes en los departamentos de Tumbes, Junín, Arequipa, Ica y Tacna, donde más del 45 por ciento de las entrevistadas consideran a ésta como una forma válida de evitar el SIDA.
- El "uso del condón" como forma de evitar el contagio del VIH/SIDA, es más frecuentemente mencionado por las mujeres de 20-24 (39 por ciento), las solteras sexualmente activas (46 por ciento), las que tienen educación superior (53 por ciento) y entre las residentes en el área urbana (42 por ciento), particularmente en Lima Metropolitana (46 por ciento) y entre las residentes en los departamentos de Ica, Loreto, Ucayali, Tacna y Madre de Dios, donde ésta razón es mencionada por más del 42 por ciento de las entrevistadas.

Cuadro 1.3

Fuentes de conocimiento del VIH/SIDA

- En general, los medios de comunicación masiva son las principales fuentes de información del conocimiento que sobre el SIDA tienen las mujeres entrevistadas: televisión (62 por ciento), radio (40 por ciento) y periódicos (27 por ciento). En segundo nivel reportan a los trabajadores de salud (26 por ciento) y la escuela (24 por ciento).
- La televisión es reportada como principal fuente de información entre las mujeres mayores de 24 años de edad (67 por ciento y más), entre las mujeres alguna vez unidas (66 por ciento), entre las mujeres con educación superior (73 por ciento) y entre las mujeres que residen en el área urbana (69 por ciento). La radio con patrón similar al de la televisión, se diferencia por ser citada en mayor proporción entre las mujeres sin educación (47 por ciento), entre las mujeres que residen en la sierra (49 por ciento), entre las de la selva (49 por ciento) y entre las del área rural (50 por ciento).
- La radio en mayor proporción que la televisión es citada como principal fuente de información en los departamentos de Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Puno, Amazonas y Cajamarca.
- La escuela es la principal fuente de información de las mujeres jóvenes, particularmente de las que tienen 15-19 años de edad (64 por ciento) y de las mujeres solteras sin experiencia sexual (58 por ciento), en porcentajes mayores a los indicados para la televisión (46 por ciento) y la radio (29 por ciento). La importancia de la escuela es mayor en el área urbana (26 por ciento) que en el área rural (16 por ciento).
- Los trabajadores de salud, son reportados en mayor proporción entre las mujeres con educación secundaria (26 por ciento), entre las mujeres de 30-39 (28 por ciento), entre las divorciadas o separadas (30 por ciento) y entre las mujeres que residen en el área rural (27 por ciento) y en la selva (34 por ciento).

Cuadro 1.4

Autopercepción del riesgo de contraer el VIH/SIDA

- Más de la mitad (57 por ciento) de las mujeres que han oído hablar del VIH/SIDA, consideran que no tienen riesgo alguno de contraerlo. Sin embargo, una cuarta parte (8 por ciento) de las que consideran que tienen algún riesgo de contraer el VIH/SIDA (33 por ciento) se autoperciben con riesgo "moderado o alto".

- La autopercepción de tener riesgo moderado o alto de contraer el VIH/SIDA es más frecuente entre las mujeres de 30-49 años de edad (9 por ciento), entre las solteras sexualmente activas (9 por ciento) y entre las mujeres con educación superior (11 por ciento). Según el lugar de residencia esta proporción es mayor al 10 por ciento en los departamentos de Ancash, Cajamarca, Loreto y Tumbes. Contrariamente, en Pasco y Piura, menos del 4 por ciento de las mujeres se autoperceben con riesgo "moderado o alto" de contraer el VIH/SIDA.

Cuadro 1.1 Conocimiento del VIH/SIDA en general por parte de las mujeres entrevistadas y conocimiento particular de formas válidas y específicas de evitar el VIH/SIDA

Distribución porcentual de mujeres por conocimiento del VIH/SIDA y de formas válidas de evitar el VIH/SIDA, y porcentaje de mujeres con conocimiento de formas específicas de evitar el VIH/SIDA, según características seleccionadas, Perú 2000

Característica	Conocimiento general				Total	Conocimiento específico ¹		
	No sabe como se puede evitar		Si sabe como se puede evitar			Mediante el uso de condón	Limitando el número de compa- ² ñeros	Número de mujeres
	No conoce VIH/SIDA	Conoce VIH/SIDA pero no sabe como evitar VIH/SIDA	Conoce una forma	Conoce dos o más formas				
Edad								
15-19	12.4	28.0	42.6	16.9	100.0	29.8	31.7	5,645
20-24	11.8	23.4	44.3	20.6	100.0	38.6	36.6	4,739
25-29	10.9	22.0	46.1	20.9	100.0	36.7	42.6	4,245
30-39	13.1	22.8	44.5	19.6	100.0	33.4	42.0	7,553
40-49	14.5	27.3	41.2	17.0	100.0	29.6	37.2	5,661
Estado conyugal								
Casada o unida	15.5	25.2	42.2	17.1	100.0	30.0	39.4	15,628
Divorciada, separada, viuda	10.9	23.4	46.5	19.2	100.0	37.7	35.5	2,236
Soltera, ha tenido relaciones	8.4	20.9	46.4	24.2	100.0	45.5	37.8	2,841
Soltera/no ha tenido relaciones	8.8	25.8	44.9	20.6	100.0	34.3	36.1	7,137
Área de residencia								
Urbana	2.9	22.8	50.9	23.4	100.0	42.0	43.9	19,453
Rural	35.3	29.3	26.9	8.5	100.0	13.1	24.6	8,390
Departamento								
Amazonas	12.6	42.3	31.4	13.7	100.0	21.4	28.1	362
Ancash	26.6	26.2	34.3	12.9	100.0	20.6	26.9	1,026
Apurímac	39.7	22.8	28.9	8.5	100.0	17.3	28.2	352
Arequipa	6.9	20.2	50.8	22.2	100.0	35.4	48.5	1,232
Ayacucho	29.5	26.1	30.5	13.9	100.0	17.9	33.2	433
Cajamarca	37.3	34.8	19.8	8.0	100.0	13.3	17.4	1,442
Cusco	33.3	21.0	37.2	8.6	100.0	14.5	31.0	1,130
Huancavelica	53.6	18.7	23.8	4.0	100.0	5.7	22.7	383
Huánuco	35.4	25.1	28.8	10.7	100.0	18.0	25.6	740
Ica	3.1	21.4	47.2	28.3	100.0	42.7	53.7	793
Junín	10.1	22.6	48.6	18.7	100.0	30.9	48.2	1,337
La Libertad	12.0	33.4	40.3	14.4	100.0	29.6	33.8	1,484
Lambayeque	8.5	38.6	38.0	15.0	100.0	29.6	29.4	1,350
Lima	1.5	19.6	54.0	24.9	100.0	45.0	45.9	9,531
Loreto	11.5	23.2	38.2	27.1	100.0	42.7	28.3	820
Madre de Dios	15.8	16.3	36.3	31.6	100.0	49.3	41.1	66
Moquegua	6.6	28.0	47.1	18.3	100.0	34.6	38.6	173
Pasco	13.3	30.8	41.3	14.6	100.0	22.2	40.2	250
Piura	9.1	34.6	38.5	17.8	100.0	34.7	30.7	2,097
Puno	39.0	19.4	36.2	5.4	100.0	8.1	35.9	1,206
San Martín	5.2	29.2	45.5	20.1	100.0	39.2	37.9	692
Tacna	4.5	13.3	48.1	34.1	100.0	46.8	54.3	328
Tumbes	0.8	14.0	56.4	28.7	100.0	40.8	45.8	235
Ucayali	6.3	28.7	43.1	21.9	100.0	44.0	30.1	381
Región natural								
Lima Metropolitana	1.1	19.3	55.2	24.4	100.0	45.5	45.5	8,634
Resto Costa	4.9	29.7	43.8	21.6	100.0	37.7	39.3	7,073
Sierra	30.2	25.5	33.8	10.5	100.0	17.3	31.2	9,021
Selva	11.6	26.6	40.0	21.8	100.0	35.8	34.9	3,115
Nivel de urbanización								
Lima Metropolitana	1.1	19.3	55.2	24.4	100.0	45.5	45.5	8,634
Otras ciudades grandes	3.4	25.8	48.2	22.7	100.0	40.0	42.0	7,753
Resto urbano	6.9	25.0	45.7	22.3	100.0	37.0	44.4	3,066
Rural	35.3	29.3	26.9	8.5	100.0	13.1	24.6	8,390
Nivel de educación								
Sin educación	61.4	25.7	10.6	2.3	100.0	3.6	9.5	1,429
Primaria	28.9	34.6	29.3	7.3	100.0	14.3	23.2	7,972
Secundaria	2.8	24.4	52.2	20.6	100.0	39.2	41.3	12,409
Superior	0.1	12.2	52.9	34.8	100.0	53.3	58.0	6,033
Total	12.7	24.7	43.7	18.9	100.0	33.3	38.1	27,843

¹ Conocimiento de formas específicas de importancia programática

² 'Pareja mutuamente fiel' o 'no tener muchas parejas sexuales'

Cuadro 11.2 Conocimiento de formas para evitar el contagio entre las mujeres con conocimiento de VIH/SIDA

Entre las mujeres con conocimiento del SIDA, porcentaje con conocimiento de formas para evitar el VIH/SIDA y porcentaje con desinformación, según características seleccionadas, Perú 2000

Característica	Formas de evitar el SIDA												Número de mujeres
	Abste-nerse de sexo	Usar con-dones	No tener muchas parejas sexuales	Ser pareja mutua-mente fiel	Evitar sexo con personas pro-miscuas	Evitar sexo con prosti-tutas	Evitar sexo homo-sexual	No com-partir jeringas o navajas de afeitado	Otras formas	No sabe que hacer	No sabe si se puede evitar	No hay forma de evitar	
Edad													
15-19	18.2	34.1	18.4	22.7	7.6	6.9	3.8	22.1	34.0	3.8	7.5	2.3	4,946
20-24	13.2	43.7	17.9	29.8	6.9	6.1	3.8	26.7	36.8	2.7	6.9	2.9	4,182
25-29	10.7	41.2	19.0	35.8	7.1	6.1	3.1	21.7	33.4	2.4	7.0	2.7	3,781
30-39	10.5	38.4	19.4	36.6	6.7	5.9	3.1	22.2	32.0	3.1	7.9	3.1	6,562
40-49	10.8	34.7	18.5	31.7	6.7	6.3	3.7	21.6	32.1	3.3	10.7	3.2	4,838
Estado conyugal													
Casada o unida	9.1	35.5	19.2	34.9	6.3	6.5	3.5	20.0	30.1	3.5	9.8	3.5	13,205
Divorciada, separada, viuda	14.3	42.3	16.7	28.1	7.7	4.7	3.3	20.9	32.0	2.7	7.7	3.1	1,993
Soltera, ha tenido relaciones	13.8	49.7	18.2	29.0	8.1	4.8	3.0	26.0	35.8	2.0	6.4	1.9	2,602
Soltera/no ha tenido rel.	18.7	37.6	18.5	26.7	7.5	6.7	3.8	27.6	39.9	2.9	5.3	1.9	6,509
Área de residencia													
Urbana	13.4	43.2	17.6	34.2	7.7	6.8	3.9	26.7	36.3	2.2	5.0	1.8	18,883
Rural	10.1	20.3	22.6	22.0	4.3	4.2	2.1	9.2	23.5	6.4	18.8	6.7	5,426
Departamento													
Amazonas	11.6	24.4	19.6	17.5	5.0	2.4	0.8	11.2	18.7	6.4	21.9	12.1	317
Ancash	18.0	28.1	9.8	31.0	5.3	2.4	1.9	21.3	22.9	4.8	15.1	5.5	754
Apurímac	1.1	28.7	34.0	21.2	6.7	9.4	2.9	15.1	28.8	4.6	21.3	2.8	212
Arequipa	13.0	38.0	26.0	39.4	11.6	5.5	2.9	30.3	32.6	2.4	4.1	2.1	1,147
Ayacucho	12.3	25.4	23.0	32.4	11.9	4.1	1.3	15.7	27.1	6.3	13.5	5.8	305
Cajamarca	8.6	21.2	11.4	18.2	7.2	5.2	1.4	10.0	18.9	8.2	28.7	7.2	903
Cusco	14.1	21.8	21.8	30.8	8.8	1.5	1.0	20.9	32.6	2.9	10.1	3.6	754
Huancavelica	7.1	12.3	18.2	38.1	8.3	4.3	2.4	9.0	41.1	5.2	5.4	10.4	178
Huánuco	10.7	27.9	6.9	36.4	12.7	7.9	1.3	20.4	33.8	1.8	12.1	4.3	478
Ica	8.9	44.1	21.5	44.8	4.1	10.9	4.6	30.6	33.2	1.8	4.8	1.2	768
Junín	8.3	34.3	26.0	37.9	4.7	5.4	1.5	13.2	29.8	4.3	7.5	2.3	1,202
La Libertad	6.7	33.7	10.6	29.9	9.6	6.6	4.4	23.8	41.5	6.0	10.8	2.7	1,307
Lambayeque	9.9	32.4	7.4	26.6	4.9	10.2	2.5	19.2	28.4	4.9	14.7	6.4	1,236
Lima	14.4	45.7	20.2	33.5	6.4	5.6	3.6	28.9	38.5	1.4	3.7	1.4	9,387
Loreto	26.9	48.3	8.0	25.8	3.5	5.5	6.3	15.6	20.7	3.1	9.8	2.9	725
Madre de Dios	11.1	58.6	15.5	38.7	11.9	10.0	1.8	12.9	24.8	1.9	9.9	0.7	55
Moquegua	11.9	37.0	13.8	32.1	20.8	7.9	3.3	21.2	28.9	6.0	5.9	2.6	162
Pasco	9.9	25.6	29.3	23.8	8.6	2.5	2.3	19.7	35.7	3.7	10.8	4.9	217
Piura	10.6	38.2	13.9	22.9	5.1	8.1	5.5	15.7	37.9	3.8	7.1	1.6	1,905
Puno	5.0	13.2	50.8	26.9	5.1	3.2	1.9	7.4	22.2	6.0	13.1	3.1	736
San Martín	10.0	41.3	7.0	37.4	10.2	15.6	7.4	21.3	29.2	2.4	7.3	7.8	656
Tacna	20.2	49.1	30.8	41.2	17.1	6.5	5.2	24.3	37.6	1.9	3.4	1.0	314
Tumbes	29.6	41.2	14.0	37.6	4.2	11.6	8.8	34.1	24.7	0.3	3.2	1.2	233
Ucayali	14.4	46.9	18.3	17.2	6.6	4.2	3.3	13.4	22.5	3.5	10.3	4.6	357
Región natural													
Lima Metropolitana	14.5	46.0	18.3	34.1	6.7	5.7	3.7	29.4	39.1	1.3	3.2	1.2	8,539
Resto Costa	11.6	39.6	16.1	30.8	6.4	7.8	4.4	23.2	34.8	3.6	7.6	2.8	6,723
Sierra	9.7	24.8	23.3	29.4	8.4	4.7	1.9	16.1	28.2	5.0	13.9	4.3	6,292
Selva	16.1	40.5	15.8	29.9	5.6	7.7	4.3	16.7	24.8	3.2	11.1	5.3	2,754
Nivel de urbanización													
Lima Metropolitana	14.5	46.0	18.3	34.1	6.7	5.7	3.7	29.4	39.1	1.3	3.2	1.2	8,539
Otras ciudades grandes	13.0	41.4	13.6	35.7	9.9	8.0	4.1	25.8	34.4	2.7	6.2	2.1	7,490
Resto urbano	10.9	39.8	25.9	30.6	4.9	6.8	4.0	20.9	33.1	3.3	7.2	2.8	2,854
Rural	10.1	20.3	22.6	22.0	4.3	4.2	2.1	9.2	23.5	6.4	18.8	6.7	5,426
Nivel de educación													
Sin educación	6.2	9.3	12.6	14.1	4.0	3.8	1.5	3.5	14.0	8.2	38.7	6.6	552
Primaria	9.1	20.1	15.9	21.0	4.9	5.5	2.6	8.4	22.3	7.0	19.2	7.0	5,669
Secundaria	14.0	40.3	18.1	30.5	7.2	6.7	3.6	24.0	33.8	2.4	5.1	2.0	12,063
Superior	13.7	53.4	23.0	44.9	8.7	6.2	4.3	35.6	45.1	0.4	0.7	0.5	6,024
Total	12.6	38.1	18.7	31.5	7.0	6.2	3.5	22.8	33.5	3.1	8.1	2.9	24,308

Nota: No se muestran los porcentajes detallados para 'evitar picaduras de mosquitos' (0.2 por ciento) y 'evitar besos' (2.0 por ciento)

Cuadro 1.3 Fuente de conocimiento de VIH/SIDA

Porcentaje de mujeres con conocimiento de VIH/SIDA y entre las mujeres con conocimiento de VIH/SIDA, porcentaje de entrevistadas por fuente de conocimiento, según características seleccionadas, Perú 2000


Característica	Conoce SIDA ¹	Número total de mujeres	Fuente de conocimiento										Número mujeres conoce SIDA	
			Radio	TV	Periódico/Revista	Pan-fletos/Afiches	Trabajador de salud	Escuela	Amigos/Parientes	Lugar de trabajo	Audio-visuales/Películas	Charlas		Otras fuentes
Edad														
15-19	87.6	5,645	28.7	46.1	19.5	7.6	21.8	63.6	17.7	0.5	3.0	14.7	1.4	4,946
20-24	88.2	4,739	38.2	58.3	24.8	9.5	26.0	34.9	14.7	1.8	3.1	18.8	1.9	4,182
25-29	89.1	4,245	41.4	66.7	30.4	8.9	26.9	14.1	11.1	2.6	2.8	19.9	1.5	3,781
30-39	86.9	7,553	44.6	68.2	29.8	8.2	28.3	6.4	11.5	2.6	2.1	19.9	1.3	6,562
40-49	85.5	5,661	45.2	68.9	30.6	8.2	24.2	4.7	12.3	3.0	2.5	20.2	1.2	4,838
Estado conyugal														
Casada o unida	84.5	15,628	44.0	65.8	26.2	7.1	28.6	7.7	11.9	2.0	1.7	20.3	1.2	13,205
Divor./separ./viuda	89.1	2,236	44.2	65.5	26.4	9.6	30.4	8.1	13.3	2.5	2.8	19.6	1.3	1,993
Soltera, con relaciones	91.6	2,841	38.9	61.8	33.6	11.0	23.3	31.6	12.2	3.2	4.0	18.7	1.7	2,602
Soltera, sin relaciones	91.2	7,137	30.6	52.9	26.6	9.7	18.9	58.2	16.9	1.6	3.9	15.2	1.9	6,509
Área de residencia														
Urbana	97.1	19,453	37.1	68.5	31.4	9.8	25.2	25.9	14.1	2.5	3.1	16.3	1.6	18,883
Rural	64.7	8,390	49.6	38.7	12.0	3.7	27.0	16.4	10.9	0.5	0.9	27.1	1.0	5,426
Departamento														
Amazonas	87.4	362	61.9	41.8	10.1	2.8	21.9	13.8	12.1	0.5	0.8	36.1	0.1	317
Ancash	73.4	1,026	29.8	52.3	18.9	4.0	33.3	27.2	14.6	1.7	1.4	23.2	0.7	754
Apurímac	60.3	352	49.3	52.3	18.4	6.5	36.5	19.7	15.8	2.0	1.6	20.7	2.3	212
Arequipa	93.1	1,232	37.9	66.0	32.4	7.9	18.1	24.1	10.9	1.7	3.2	15.2	2.6	1,147
Ayacucho	70.5	433	45.2	43.8	19.1	6.1	30.3	25.8	10.4	1.8	1.3	29.6	2.7	305
Cajamarca	62.7	1,442	66.4	40.4	15.6	4.5	18.9	11.4	6.5	0.5	3.1	25.3	3.1	903
Cusco	66.7	1,130	46.6	50.2	18.7	9.6	22.6	26.9	8.6	1.3	3.4	21.6	4.4	754
Huancavelica	46.4	383	46.1	44.4	11.3	6.1	34.5	17.5	11.6	1.4	1.7	35.5	0.7	178
Huánuco	64.6	740	57.1	55.4	17.9	5.4	22.2	20.3	10.7	1.9	2.5	45.9	1.5	478
Ica	96.9	793	34.0	71.8	24.5	9.7	28.6	23.4	12.8	2.0	3.7	13.3	1.6	768
Junín	89.9	1,337	51.7	73.0	28.6	2.3	13.6	25.2	5.2	0.7	0.6	17.6	0.4	1,202
La Libertad	88.0	1,484	33.2	58.5	24.4	9.4	26.5	24.6	19.9	1.5	3.9	17.2	2.1	1,307
Lambayeque	91.5	1,350	41.6	67.3	32.9	6.9	18.4	22.6	8.8	1.1	2.5	28.2	1.6	1,236
Lima	98.5	9,531	33.1	67.2	31.9	10.7	27.4	26.1	16.8	3.0	2.5	12.8	1.0	9,387
Loreto	88.5	820	37.7	48.3	24.0	9.4	47.6	21.4	18.1	1.7	2.2	29.1	3.0	725
Madre de Dios	84.2	66	48.2	54.2	20.0	7.4	41.5	19.5	14.3	3.3	3.7	23.1	0.6	55
Moquegua	93.4	173	42.2	68.0	22.7	10.2	34.0	21.3	7.2	1.8	1.8	18.0	1.9	162
Pasco	86.7	250	52.0	53.3	21.5	2.9	23.0	16.3	7.5	0.3	2.5	35.3	1.1	217
Piura	90.9	2,097	41.3	66.2	31.5	6.9	16.4	23.3	5.8	1.6	2.5	11.8	0.8	1,905
Puno	61.0	1,206	57.8	40.1	11.3	4.2	18.0	17.2	10.3	0.9	1.8	28.4	1.8	736
San Martín	94.8	692	53.7	59.3	20.3	4.1	35.4	22.9	15.5	1.8	3.2	35.5	1.3	656
Tacna	95.5	328	42.9	73.1	36.3	28.8	42.3	30.9	24.7	7.5	12.1	21.1	0.6	314
Tumbes	99.2	235	20.9	57.6	15.7	6.7	24.5	27.0	19.8	1.8	3.6	11.2	0.3	233
Ucayali	93.7	381	34.2	50.4	19.7	7.0	38.2	16.3	9.9	0.8	1.3	27.3	2.1	357
Región natural														
Lima Metropolitana	98.9	8,637	32.2	68.0	32.7	11.2	26.1	27.0	17.2	3.2	2.7	13.0	1.0	8,541
Resto costa	94.9	7,067	36.9	67.0	29.1	8.7	25.6	24.1	11.5	1.8	3.0	16.6	1.3	6,707
Sierra	69.8	9,023	49.4	52.0	20.6	5.2	21.0	20.8	10.4	1.3	2.4	22.7	2.1	6,302
Selva	88.5	3,116	49.1	53.1	19.8	6.3	34.2	20.2	13.1	1.3	1.8	32.4	1.6	2,758
Nivel de urbanización														
Lima Metropolitana	98.9	8,637	32.2	68.0	32.7	11.2	26.1	27.0	17.2	3.2	2.7	13.0	1.0	8,541
Otras ciudades grandes	96.5	7,755	41.1	69.8	32.7	9.3	23.4	25.6	11.5	2.2	3.9	18.2	2.5	7,487
Resto urbano	93.1	3,056	41.3	66.6	24.4	6.5	27.0	23.9	11.9	1.4	2.4	21.4	0.7	2,846
Rural	64.7	8,395	49.5	38.8	12.1	3.7	26.8	16.4	10.9	0.6	0.9	27.0	1.0	5,433
Nivel de educación														
Sin educación	38.6	1,429	46.7	32.7	3.1	0.1	20.8	1.1	11.8	0.1	0.1	31.9	1.4	552
Primaria	71.1	7,972	45.6	49.6	12.1	3.0	25.3	4.9	13.3	0.8	0.6	25.1	0.9	5,669
Secundaria	97.2	12,409	37.5	63.7	26.5	8.0	26.1	31.5	14.2	1.1	2.2	14.8	0.9	12,063
Superior	99.9	6,033	38.6	72.5	44.7	15.1	25.2	28.2	12.0	5.5	5.7	19.2	3.0	6,024
Total	87.3	27,843	39.9	61.9	27.1	8.4	25.6	23.8	13.4	2.1	2.6	18.7	1.4	24,308

¹ Incluye las mujeres que respondieron espontáneamente (Cuadro 10.1) más aquellas que respondieron con sondeo

Cuadro 1.4 Percepción del riesgo a contraer SIDA

Distribución porcentual de entrevistadas que conocen el SIDA por percepción del riesgo a contraer SIDA, según características seleccionadas, Perú 2000

Característica	Ningún riesgo	Algún riesgo			Sin información	Total	Número de mujeres
		Riesgo mínimo	Riesgo moderado	Riesgo alto			
Edad							
15-19	65.1	20.9	2.5	1.9	9.5	100.0	4,946
20-24	58.9	25.8	4.1	3.0	8.3	100.0	4,182
25-29	54.7	28.0	4.6	2.9	9.8	100.0	3,781
30-39	52.2	28.1	5.5	3.3	10.9	100.0	6,562
40-49	53.0	26.7	5.2	3.6	11.4	100.0	4,838
Estado conyugal							
Casada o unida	52.4	27.0	5.2	3.2	12.2	100.0	13,205
Divorciada, separada, viuda	57.9	25.1	4.9	3.4	8.7	100.0	1,993
Soltera, ha tenido relaciones	54.4	29.5	5.1	3.4	7.7	100.0	2,602
Soltera, no ha tenido relaciones	65.4	22.7	2.5	2.2	7.2	100.0	6,509
Área de residencia							
Urbana	56.3	28.5	5.1	3.2	6.9	100.0	18,883
Rural	57.4	17.0	2.3	2.1	21.3	100.0	5,426
Departamento							
Amazonas	64.4	7.1	4.0	1.8	22.7	100.0	317
Ancash	53.2	22.3	4.2	6.3	14.0	100.0	754
Apurímac	39.4	25.7	2.4	1.6	30.8	100.0	212
Arequipa	55.8	31.6	5.2	2.9	4.5	100.0	1,147
Ayacucho	52.2	23.1	3.3	1.5	19.8	100.0	305
Cajamarca	41.8	16.6	4.0	7.2	30.4	100.0	903
Cusco	60.6	23.7	5.7	2.6	7.5	100.0	754
Huancavelica	72.3	15.1	3.3	2.8	6.4	100.0	178
Huánuco	53.7	29.1	2.4	1.9	13.0	100.0	478
Ica	52.7	29.2	5.7	4.1	8.3	100.0	768
Junín	64.3	15.3	5.1	4.0	11.3	100.0	1,202
La Libertad	52.5	19.1	6.1	3.2	19.1	100.0	1,307
Lambayeque	53.1	19.1	3.3	3.5	21.0	100.0	1,236
Lima	57.0	30.7	4.6	2.7	5.0	100.0	9,387
Loreto	57.4	21.1	8.4	3.6	9.6	100.0	725
Madre de Dios	74.0	14.9	5.1	1.9	4.1	100.0	55
Moquegua	62.3	19.8	5.8	2.8	9.4	100.0	162
Pasco	71.7	19.0	2.0	0.6	6.8	100.0	217
Piura	54.4	32.9	1.9	1.0	9.8	100.0	1,905
Puno	66.1	16.8	2.7	1.5	12.9	100.0	736
San Martín	62.4	20.5	5.3	2.9	8.9	100.0	656
Tacna	63.5	22.6	3.3	2.8	7.8	100.0	314
Tumbes	37.7	43.9	4.2	8.0	6.2	100.0	233
Ucayali	65.3	17.0	5.5	2.0	10.2	100.0	357
Región natural							
Lima Metropolitana	56.6	31.3	5.0	2.7	4.3	100.0	8,541
Resto costa	54.5	26.7	3.8	3.0	12.0	100.0	6,707
Sierra	56.3	21.2	3.9	3.5	15.1	100.0	6,302
Selva	61.6	18.1	5.6	2.6	12.0	100.0	2,758
Nivel de urbanización							
Lima Metropolitana	56.6	31.3	5.0	2.7	4.3	100.0	8,541
Otras ciudades grandes	55.5	27.0	5.4	3.9	8.2	100.0	7,487
Resto urbano	57.4	24.2	4.4	3.0	11.0	100.0	2,846
Rural	57.4	17.0	2.3	2.1	21.3	100.0	5,433
Nivel de educación							
Sin educación	45.7	13.6	2.0	2.1	36.7	100.0	552
Primaria	51.9	19.4	3.7	2.6	22.4	100.0	5,669
Secundaria	61.0	25.3	3.8	2.7	7.2	100.0	12,063
Superior	52.9	34.5	6.8	3.9	1.9	100.0	6,024
Total	56.5	25.9	4.5	3.0	10.1	100.0	24,308



1.2 CONOCIMIENTO DE ASUNTOS RELACIONADOS CON EL VIH/SIDA

A las mujeres entrevistadas se les hizo una serie de preguntas sobre asuntos relacionados con el VIH/SIDA como medio de evaluar el grado de conocimiento sobre el tema. Se preguntó específicamente si una persona que parece saludable puede estar infectada y si el virus de VIH puede ser transmitido de la madre al niño y en qué momento. Los resultados se presentan en el Cuadro 1.5.

Igualmente se preguntó a las entrevistadas específicamente sobre aspectos sociales de la prevención del SIDA y relacionados con asuntos tales como la discriminación de las personas con SIDA; los derechos, a menudo conflictivos, de la persona con SIDA a su privacidad y a tener relaciones sexuales y los de la comunidad a protegerse de la enfermedad. Los resultados se detallan en el Cuadro 1.6.

Cuadros 1.5 y 1.6

Conocimiento de asuntos relacionados con el VIH/SIDA (Cuadro 1.5)

- Siete de cada diez mujeres entrevistadas saben que una persona puede lucir saludable pero estar contagiada con VIH/SIDA, conocimiento que es menos frecuente entre las mujeres sin educación (15 por ciento) y entre las residentes en el área rural y en los departamentos de Huancavelica, Puno, Apurímac, y Cajamarca, donde esta proporción es menor al 37 por ciento.
- De otro lado, casi todas las entrevistadas (97 por ciento) conocen que la enfermedad se puede transmitir de la madre al niño. Pero, no todas saben en qué momento se puede dar el contagio (17 por ciento), proporción que es más alta entre las mujeres sin educación (71 por ciento). En el área rural y en los departamentos de Puno, Cajamarca, Apurímac y Huancavelica, dicha proporción es igual o mayor 43 por ciento.

Aspectos sociales de la prevención del SIDA (Cuadro 1.6)

- Nueve de cada diez mujeres declaran conocer el VIH/SIDA, sin embargo proporción significativa de ellas evidencian la presencia de ciertos tabúes en su conocimiento de la enfermedad: el 48 por ciento respondió que un maestro con SIDA (a manera de ejemplo) no puede seguir enseñando. De manera similar, un 51 por ciento considera que la persona infectada debe ser despedida del trabajo. Opinión esta última que es más frecuente

entre las mujeres con educación superior y entre las residentes en el área urbana, particularmente en Lima Metropolitana y en los departamentos de Ica, Piura y Arequipa, donde más del 60 por ciento de las mujeres piensa de esa manera.

- De otro lado, una de cada cinco mujeres que han oído hablar del VIH/SIDA están dispuestas a cuidar un pariente infectado en el hogar, proporción que es mayor en el área rural (25 por ciento) que en el área urbana (18 por ciento).

Cuadro 1.5 Conocimiento de asuntos relacionados con el VIH/SIDA

Distribución porcentual de mujeres que conocen VIH/SIDA por conocimiento de asuntos relacionados con el VIH/SIDA, según características seleccionadas, Perú 2000

Característica	Una persona que luce saludable puede tener SIDA			El VIH/SIDA se puede transmitir de la madre al niño				Número de mujeres
	Si	No	No sabe/ No conoce/ Sin inform.	No	Durante embarazo o parto	Durante la lactancia	No sabe	
Edad								
15-19	70.3	11.0	18.7	3.1	56.8	36.4	16.6	5,645
20-24	73.3	8.3	18.5	2.4	62.4	32.9	15.7	4,739
25-29	73.0	9.6	17.3	3.0	64.0	28.5	15.5	4,245
30-39	69.8	9.1	21.1	2.5	61.5	25.9	18.0	7,553
40-49	66.4	9.0	24.5	2.3	58.4	24.4	20.3	5,661
Estado conyugal								
Casada o unida	65.2	10.2	24.6	2.9	56.7	26.4	21.1	15,628
Divorciada, separada, viuda	74.0	8.0	18.0	2.4	62.2	28.4	14.9	2,236
Soltera, ha tenido relaciones	79.5	6.8	13.7	2.3	66.3	32.2	12.5	2,841
Soltera/no ha tenido relaciones	76.7	9.1	14.2	2.3	65.6	34.9	12.1	7,137
Área de residencia								
Urbana	85.0	6.4	8.5	1.9	73.9	33.1	6.0	19,453
Rural	36.2	16.3	47.6	4.4	29.2	20.4	43.9	8,390
Departamentos								
Amazonas	48.7	23.5	27.9	5.7	47.5	28.1	22.7	362
Ancash	52.9	9.6	37.5	3.1	42.2	22.1	32.7	1,026
Apurímac	31.9	9.6	58.5	2.1	31.8	25.1	47.7	352
Arequipa	83.0	5.9	11.1	2.3	70.6	32.8	9.6	1,232
Ayacucho	44.5	12.6	42.9	2.8	40.7	22.4	38.6	433
Cajamarca	36.5	11.5	52.0	3.4	31.7	18.4	45.6	1,442
Cusco	42.8	11.1	46.2	3.3	38.0	20.0	40.5	1,130
Huancavelica	29.3	14.2	56.5	3.4	24.4	17.7	55.1	383
Huánuco	48.5	9.6	41.9	2.1	42.6	19.5	40.7	740
Ica	82.9	7.3	9.8	2.4	69.4	33.3	9.6	793
Junín	64.3	17.9	17.8	2.1	63.5	26.2	14.5	1,337
La Libertad	70.0	7.7	22.3	2.3	55.9	32.1	18.3	1,484
Lambayeque	70.1	7.7	22.2	1.8	61.1	29.6	15.8	1,350
Lima	88.9	5.2	5.9	1.7	77.7	32.0	4.1	9,531
Loreto	70.9	12.1	17.0	4.0	48.1	36.4	20.2	820
Madre de Dios	69.4	4.7	26.0	0.5	65.1	32.3	20.2	66
Moquegua	76.7	9.0	14.4	1.3	71.9	22.1	11.3	173
Pasco	61.4	18.5	20.1	4.0	55.4	28.1	16.7	250
Piura	71.9	11.5	16.6	3.9	61.2	27.1	13.7	2,097
Puno	30.9	21.2	47.8	4.8	24.3	25.5	43.9	1,206
San Martín	75.1	14.1	10.8	5.7	58.9	45.3	9.0	692
Tacna	83.7	6.3	10.0	1.2	75.9	39.4	7.5	328
Tumbes	87.1	5.7	7.2	2.6	73.6	46.7	4.3	235
Ucayali	73.0	13.8	13.2	6.6	53.7	37.4	12.7	381
Región natural								
Lima Metropolitana	90.7	4.6	4.7	1.5	80.0	32.3	3.0	8,634
Resto Costa	77.9	8.7	13.3	2.6	65.5	32.0	9.9	7,073
Sierra	46.6	12.6	40.8	3.2	40.4	22.7	36.8	9,021
Selva	65.1	15.0	20.0	4.5	52.8	34.1	18.1	3,115
Nivel de urbanización								
Lima Metropolitana	90.7	4.6	4.7	1.5	80.0	32.3	3.0	8,634
Otras ciudades grandes	83.4	6.5	10.1	1.9	71.3	34.3	7.1	7,753
Resto urbano	73.1	11.3	15.6	3.0	63.4	32.5	11.5	3,066
Rural	36.2	16.3	47.6	4.4	29.2	20.4	43.9	8,390
Nivel de educación								
Sin educación	15.1	9.9	75.0	3.0	12.2	7.1	71.2	1,429
Primaria	41.8	15.7	42.5	4.6	32.9	20.9	38.1	7,972
Secundaria	82.7	8.5	8.7	2.2	70.4	35.0	5.9	12,409
Superior	95.5	2.7	1.8	0.9	87.7	33.9	0.8	6,033
Total	70.3	9.4	20.3	2.7	60.4	29.3	17.4	27,843

Cuadro 1.6 Aspectos sociales de la prevención del SIDA y su mitigación

Distribución porcentual de mujeres que conocen de VIH/SIDA por respuestas a preguntas sobre ciertos aspectos sociales de la prevención y mitigación del SIDA, según características seleccionadas, Perú 2000

Características	Maestro con SIDA puede seguir enseñando			Persona infectada debe ser despedida del trabajo			Dispuesta a cuidar pariente infectado en el hogar			Número de mujeres
	No	Si	No sabe	No	Si	No sabe	No	Si	No sabe	
Edad										
15-19	47.6	36.6	15.8	32.6	50.1	17.3	59.2	19.4	21.4	5,645
20-24	54.5	31.1	14.4	28.7	55.4	15.8	62.3	18.0	19.8	4,739
25-29	50.6	35.3	14.2	31.4	53.7	14.8	61.0	19.8	19.2	4,245
30-39	46.0	37.1	16.9	32.3	49.7	18.0	54.4	22.2	23.4	7,553
40-49	43.6	38.1	18.3	31.8	48.2	20.0	57.3	19.2	23.5	5,661
Estado conyugal										
Casada o unida	41.6	39.1	19.3	33.0	46.2	20.8	52.4	22.6	25.0	15,628
Divorciada, separada, viuda	50.1	35.8	14.1	34.3	50.0	15.7	60.7	19.3	19.9	2,236
Soltera, ha tenido relaciones	57.9	31.2	10.9	28.2	59.7	12.1	66.5	16.3	17.3	2,841
Soltera, no ha tenido relac.	57.3	30.9	11.7	28.8	58.6	12.6	67.2	15.7	17.1	7,137
Área de residencia										
Urbana	60.5	33.9	5.6	30.0	63.2	6.9	69.6	17.7	12.8	19,453
Rural	18.9	40.7	40.5	35.1	23.0	41.9	32.2	25.2	42.6	8,390
Departamento										
Amazonas	27.2	53.0	19.8	41.0	35.5	23.6	44.6	30.2	25.1	362
Ancash	35.7	31.2	33.1	27.9	36.1	36.0	50.1	14.0	36.0	1,026
Apurímac	19.5	31.6	48.9	31.3	19.3	49.4	25.5	25.0	49.5	352
Arequipa	58.7	31.9	9.4	28.0	62.4	9.6	65.6	18.8	15.7	1,232
Ayacucho	28.8	33.9	37.3	29.0	32.3	38.7	42.9	18.0	39.2	433
Cajamarca	20.3	36.1	43.6	32.9	23.0	44.1	33.1	19.4	47.5	1,442
Cusco	25.5	38.5	36.1	34.9	27.8	37.3	29.5	32.7	37.8	1,130
Huancavelica	16.5	28.2	55.3	23.2	21.2	55.7	27.6	14.9	57.5	383
Huánuco	31.0	30.4	38.6	31.0	30.2	38.8	42.2	18.0	39.8	740
Ica	58.1	35.3	6.7	31.6	60.1	8.3	64.1	17.6	18.3	793
Junín	43.8	43.0	13.3	35.8	51.2	13.0	62.1	22.9	15.0	1,337
La Libertad	47.5	35.0	17.5	32.3	46.2	21.5	61.4	16.6	22.0	1,484
Lambayeque	47.4	38.9	13.6	25.9	56.2	18.0	56.2	23.6	20.2	1,350
Lima	66.0	30.5	3.5	29.0	66.6	4.4	71.8	16.4	11.8	9,531
Loreto	30.7	52.9	16.4	48.0	31.6	20.3	47.0	28.8	24.2	820
Madre de Dios	47.2	32.8	19.9	26.6	53.3	20.0	50.7	18.4	30.9	66
Moquegua	58.7	29.8	11.6	28.1	58.5	13.4	72.5	13.7	13.8	173
Pasco	33.3	51.5	15.2	39.7	45.2	15.1	55.3	26.8	18.0	250
Piura	46.4	41.5	12.1	27.4	60.2	12.4	63.7	22.6	13.7	2,097
Puno	21.9	36.5	41.6	36.2	21.7	42.1	32.8	25.0	42.1	1,206
San Martín	33.1	60.7	6.2	48.7	44.2	7.1	55.9	32.9	11.2	692
Tacna	55.4	37.2	7.5	33.9	58.6	7.5	64.4	16.1	19.5	328
Tumbes	57.7	36.9	5.5	35.4	56.3	8.3	65.5	14.1	20.4	235
Ucayali	44.9	44.6	10.5	37.8	47.1	15.1	60.8	16.1	23.1	381
Región										
Lima Metropolitana	67.9	29.3	2.7	28.3	68.0	3.7	73.0	15.7	11.3	8,637
Resto Costa	53.2	37.6	9.2	30.0	58.6	11.4	65.6	19.0	15.4	7,067
Sierra	29.7	35.6	34.6	31.7	33.2	35.2	41.1	22.1	36.8	9,023
Selva	33.5	51.3	15.2	43.4	38.9	17.7	51.0	27.6	21.4	3,116
Nivel de urbanización										
Lima Metropolitana	67.9	29.3	2.7	28.3	68.0	3.7	73.0	15.7	11.3	8,637
Otras ciudades grandes	57.9	35.4	6.7	29.5	62.2	8.3	68.8	18.1	13.1	7,755
Resto urbano	46.3	42.8	10.9	35.5	52.3	12.2	61.8	22.3	15.9	3,056
Rural	18.8	40.7	40.4	35.2	23.0	41.8	32.2	25.2	42.6	8,395
Nivel de educación										
Sin educación	8.4	24.0	67.6	20.8	10.3	69.0	16.6	14.8	68.6	1,429
Primaria	19.7	46.1	34.2	38.5	25.5	36.0	35.8	27.7	36.5	7,972
Secundaria	55.9	38.4	5.7	34.5	58.4	7.2	67.4	19.4	13.2	12,409
Superior	78.5	20.3	1.3	18.7	79.5	1.8	79.2	12.1	8.7	6,033
Total	48.0	35.9	16.1	31.5	51.1	17.4	58.3	19.9	21.8	27,843

1.3 CONOCIMIENTO DE LAS ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ETS)


Los programas de control de VIH/SIDA reconocen en la actualidad la importancia de controlar las ETS para reducir la transmisión del VIH. Se reconoce que entre los esfuerzos necesarios, uno de los más importantes es la educación para que la población reconozca los síntomas de las ETS. También se reconoce que poco se sabe sobre cómo los hombres y mujeres perciben y responden a las ETS. Por esta razón en la ENDES 2000 se preguntó a las entrevistadas si habían oído hablar de otras enfermedades que se pueden transmitir a través del contacto sexual; cuáles enfermedades conocían; y si conocían síntomas y signos para reconocer que un hombre o una mujer tenían una enfermedad de transmisión sexual. Los resultados se pueden apreciar en los Cuadros 1.7 y 1.8; y en el Gráfico 1.2.

Cuadro 1.7 y 1.8; y Gráfico 1.2

Conocimiento de las ETS y de sus síntomas y signos

- Sólo el 49 por ciento de las mujeres en el país ha oído hablar de otras enfermedades que se pueden transmitir a través del contacto sexual: 1.8 por ciento conoce un síntoma y 28.6 por ciento 2 o más síntomas. Un 9 por ciento ha oído de las ETS pero no conoce síntoma alguno de ellas.
- El desconocimiento de la existencia de otras ETS es más alto entre las mujeres sin educación, el 91 por ciento de ellas no ha oído hablar de otras enfermedades que se pueden transmitir a través del contacto sexual. En el área rural y en los departamentos de Cajamarca, Huancavelica y Puno, dicha proporción es mayor al 78 por ciento.
- La Sífilis (64 por ciento) y la Gonorrea (59 por ciento) son las ETS que en mayor proporción reconocen las mujeres que han oído hablar de las ETS, nivel que es mayor en el área urbana que en el área rural. El nivel más bajo de reconocimiento de estas enfermedades se presenta entre las mujeres sin educación (27 por ciento).
- Los síntomas o signos de las ETS que en mayor proporción identifican las mujeres que han oído hablar de las enfermedades de transmisión sexual, son: secreción vaginal (15 por ciento), úlceras genitales (15 por ciento), enrojecimiento /picação en los genitales (24 por ciento) y pérdida de peso (32 por ciento). El enrojecimiento/picação en los genitales, es reportado con mayor frecuencia entre las mujeres de 25-39 años de edad (26 por ciento), entre las solteras sexualmente activas (26 por ciento), entre las mujeres con educación superior (29 por ciento) y entre las residentes en los departamentos de Tumbes, Tacna, Junín y San Martín, por más del 32 por ciento de las mujeres que han oído de ETS.

Gráfico 1.2
Conocimiento de Síntomas
de las Enfermedades de Transmisión Sexual



Cuadro 1.7 Conocimiento de los síntomas de las enfermedades de transmisión sexual (ETS) y ETS específicas

Distribución porcentual de las mujeres por conocimiento de los síntomas asociados con las enfermedades de transmisión sexual (ETS), y porcentaje de mujeres por ETS que conocen, según características seleccionadas, Perú 2000

Característica	No conoce sobre las ETS	Síntomas específicos de las ETS			Total	Número de mujeres	Conoce ETS específicas				Número de mujeres
		No conoce síntomas de ETS	Conoce un síntoma	Conoce dos o más síntomas			Conoce sífilis	Conoce gonorrea	Verrugas genitales/condiloma	Otras ETS	
Edad											
15-19	50.7	9.3	12.8	27.2	100.0	5,645	66.7	67.3	4.2	17.3	2,786
20-24	47.6	8.7	12.2	31.5	100.0	4,739	65.7	60.8	4.9	20.9	2,483
25-29	49.5	9.1	11.4	30.0	100.0	4,245	62.7	57.8	4.2	22.3	2,144
30-39	51.9	8.7	11.5	27.7	100.0	7,553	61.4	53.7	4.4	24.1	3,631
40-49	51.9	9.0	11.1	27.9	100.0	5,661	63.0	56.6	4.5	20.8	2,723
Estado conyugal											
Casada o unida	55.9	8.5	10.5	25.0	100.0	15,628	60.2	54.9	4.5	22.1	6,893
Divorc./separada/viuda	47.8	9.0	10.8	32.4	100.0	2,236	59.8	56.3	4.7	24.0	1,167
Soltera, ha tenido rel.	40.7	9.4	12.2	37.8	100.0	2,841	69.6	61.8	4.8	23.4	1,685
Soltera/no ha tenido	43.7	9.7	14.7	31.9	100.0	7,137	68.6	65.4	4.1	18.0	4,021
Área de residencia											
Urbana	38.4	10.6	14.6	36.3	100.0	19,453	65.5	59.6	4.5	21.2	11,988
Rural	78.8	5.1	5.2	10.9	100.0	8,390	52.4	54.4	3.8	21.0	1,779
Departamento											
Amazonas	60.4	11.5	9.9	18.1	100.0	362	56.5	62.7	5.8	15.7	144
Ancash	68.8	7.5	8.4	15.2	100.0	1,026	48.1	46.8	3.7	17.3	320
Apurímac	69.9	8.7	6.1	15.1	100.0	352	67.1	45.3	6.8	14.7	106
Arequipa	39.6	11.1	11.8	37.4	100.0	1,232	63.3	59.1	3.5	21.3	744
Ayacucho	66.5	8.9	6.4	18.3	100.0	433	65.4	51.4	4.7	22.0	145
Cajamarca	81.9	4.8	4.7	8.5	100.0	1,442	53.3	58.2	6.7	21.8	261
Cusco	66.6	10.8	6.9	15.4	100.0	1,130	69.2	60.7	3.2	15.9	377
Huancavelica	81.9	2.7	3.1	12.3	100.0	383	65.5	52.7	2.4	17.6	69
Huánuco	69.1	3.9	7.6	19.3	100.0	740	78.5	72.0	9.0	10.6	229
Ica	47.9	11.0	12.6	28.5	100.0	793	66.6	64.5	5.5	11.9	413
Junín	45.9	14.0	10.0	30.2	100.0	1,337	68.0	52.3	1.7	19.1	724
La Libertad	52.9	11.3	8.8	27.1	100.0	1,484	60.4	52.7	3.6	20.1	700
Lambayeque	66.6	8.5	7.1	17.8	100.0	1,350	66.5	71.3	2.3	12.1	451
Lima	35.8	9.6	17.5	37.1	100.0	9,531	64.8	51.1	4.3	25.5	6,121
Loreto	32.1	9.3	10.6	48.0	100.0	820	54.3	91.7	4.4	22.1	556
Madre de Dios	46.3	7.0	9.4	37.2	100.0	66	73.2	67.5	5.9	21.3	35
Moquegua	40.1	15.5	15.9	28.4	100.0	173	60.6	58.4	0.6	13.8	104
Pasco	60.8	9.3	11.2	18.7	100.0	250	67.3	58.8	4.9	17.6	98
Piura	61.5	6.7	9.5	22.2	100.0	2,097	71.4	70.2	8.7	9.9	808
Puno	82.4	4.0	3.7	9.9	100.0	1,206	49.1	38.1	8.8	25.2	212
San Martín	29.2	8.1	7.9	54.8	100.0	692	54.8	93.1	2.7	20.3	490
Tacna	40.3	9.8	14.5	35.3	100.0	328	70.7	70.4	3.4	22.2	196
Tumbes	16.0	3.2	29.1	51.6	100.0	235	59.9	65.9	5.5	26.7	197
Ucayali	30.2	14.5	15.9	39.5	100.0	381	60.6	90.3	5.3	18.5	266
Region natural											
Lima Metropolitana	32.9	9.9	18.6	38.6	100.0	8,634	65.3	51.2	4.2	24.8	5,795
Resto Costa	52.8	9.6	10.9	26.7	100.0	7,073	63.8	63.2	5.0	16.4	3,330
Sierra	68.8	7.1	6.5	17.5	100.0	9,021	63.9	54.6	4.3	20.1	2,822
Selva	41.6	10.2	10.3	37.8	100.0	3,115	58.7	82.5	4.2	20.5	1,820
Nivel de urbanización											
Lima Metropolitana	32.9	9.9	18.6	38.6	100.0	8,634	65.3	51.2	4.2	24.8	5,795
Otras ciudades grandes	40.0	11.9	11.9	36.2	100.0	7,753	66.7	68.2	4.9	18.2	4,650
Resto urbano	49.6	9.6	10.5	30.4	100.0	3,066	62.5	65.1	4.4	17.3	1,534
Rural	78.8	5.1	5.2	10.9	100.0	8,390	52.3	54.5	3.8	20.9	1,788
Nivel de educación											
Sin educación	91.3	3.6	2.0	2.9	100.0	1,429	26.9	20.0	0.6	33.1	125
Primaria	80.3	5.8	5.0	8.9	100.0	7,972	36.1	42.0	3.3	25.5	1,571
Secundaria	44.4	10.9	14.2	30.5	100.0	12,409	60.6	55.9	3.6	20.7	6,902
Superior	14.3	10.5	18.1	57.0	100.0	6,033	77.3	69.1	6.0	20.3	5,169
Total	50.6	9.0	11.8	28.6	100.0	27,843	63.8	58.9	4.4	21.2	13,766

Cuadro 1.8 Conocimiento de síntomas y signos de las enfermedades de transmisión sexual (ETS)

Entre las mujeres con conocimiento de ETS, porcentaje con conocimiento de síntomas y signos específicos, según características seleccionadas, Perú 2000

Característica	Síntomas y signos de las ETS														Número de mujeres
	Dolor abdominal	Secreción vaginal	Secreción olfente	Molestias orinar	Enrojecimiento o picazón en genitales	Inflamación o hinchazón en genitales	Úlceras o llagas genitales	Verrugas genitales	Sangre en la orina	Pérdida de peso	Puede no haber síntomas	Secreción o pús por el pene	Otros síntomas	No conoce síntomas	
Edad															
15-19	6.5	10.4	8.3	9.3	17.9	10.0	15.3	3.4	1.7	36.9	2.5	6.9	34.7	18.9	2,786
20-24	7.8	14.6	11.0	13.2	24.5	13.0	15.5	4.6	2.6	33.2	3.3	8.0	29.6	16.5	2,483
25-29	6.1	16.2	10.3	10.4	26.4	14.8	14.8	4.1	2.2	31.4	3.3	7.1	30.2	18.0	2,144
30-39	7.6	16.0	10.7	11.2	26.3	14.7	15.3	3.5	2.4	28.4	3.8	9.3	28.3	18.2	3,631
40-49	7.0	15.5	11.6	10.1	23.5	14.2	14.3	4.1	2.2	29.9	3.8	10.6	28.8	18.8	2,723
Estado conyugal															
Casada o unida	6.8	15.9	11.2	11.7	24.7	13.6	14.2	3.7	2.3	28.0	3.2	10.0	26.7	19.3	6,893
Divor./separada/viuda	8.2	15.6	11.2	11.2	24.9	15.8	15.0	3.7	1.4	30.3	3.6	9.8	32.3	17.2	1,167
Soltera, ha tenido relac.	6.5	17.4	11.8	12.2	26.4	14.7	16.2	4.2	2.3	33.2	4.4	9.3	32.7	15.8	1,685
Soltera, no ha tenido rel.	7.4	10.8	8.2	8.7	20.5	11.6	16.1	4.2	2.3	38.0	3.1	5.3	34.7	17.3	4,021
Área de residencia															
Urbana	7.1	14.0	10.7	10.4	23.9	13.8	15.6	4.1	2.3	32.9	3.4	8.2	31.5	17.3	11,988
Rural	7.1	18.6	8.1	14.0	22.4	10.6	11.5	2.6	1.8	24.3	3.1	10.5	21.7	23.9	1,779
Departamento															
Amazonas	7.4	18.8	5.8	5.8	18.3	12.5	12.7	3.5	4.4	24.8	1.4	7.6	18.3	29.2	144
Ancash	6.8	11.2	4.7	6.4	19.3	15.6	14.2	1.4	1.7	25.1	3.1	5.4	33.2	24.1	320
Apurímac	13.4	15.6	14.3	6.2	20.8	7.5	13.4	1.6	0.3	31.9	1.0	2.3	19.9	29.0	106
Arequipa	7.6	19.9	14.0	11.8	27.8	11.1	13.7	5.6	1.6	26.6	2.7	5.3	37.3	18.4	744
Ayacucho	8.6	22.0	14.1	6.9	17.8	13.3	11.9	4.0	2.7	29.1	2.2	4.7	29.9	26.4	145
Cajamarca	9.7	12.7	10.9	5.5	17.6	13.3	9.1	2.4	0.6	32.1	4.2	2.4	27.9	26.7	261
Cusco	4.9	12.0	11.0	9.7	23.1	14.0	11.7	1.3	0.3	20.1	0.0	5.2	26.0	32.5	377
Huancavelica	11.5	18.8	13.3	20.0	12.7	8.5	7.9	7.3	7.3	45.5	0.6	0.6	33.3	15.2	69
Huánuco	15.9	11.2	5.9	9.3	17.1	14.0	10.6	5.0	1.9	49.8	3.1	3.1	34.0	12.8	229
Ica	5.3	11.7	11.1	8.9	18.3	15.3	17.7	8.5	2.1	35.3	1.1	11.7	28.3	21.1	413
Junín	4.0	31.4	4.7	3.5	35.2	8.7	8.4	0.7	2.0	34.2	0.3	2.3	14.1	25.8	724
La Libertad	6.8	9.7	7.0	5.7	21.4	16.1	15.5	1.9	1.5	35.2	0.6	4.4	41.7	23.9	700
Lambayeque	3.4	11.8	12.4	6.5	19.7	17.7	13.8	1.1	1.4	34.4	6.2	3.7	32.7	25.4	451
Lima	6.9	11.4	10.3	10.0	25.2	14.3	16.4	4.7	2.8	33.4	4.2	6.1	31.3	14.9	6,121
Loreto	13.2	22.5	16.4	27.4	15.0	11.0	12.7	2.1	1.2	18.8	2.2	39.4	34.2	13.7	556
Madre de Dios	6.7	25.9	24.0	25.2	26.6	14.0	19.5	8.2	4.4	24.2	14.0	17.9	12.4	13.0	35
Moquegua	6.9	18.2	13.8	8.8	19.1	8.5	10.8	3.1	1.8	26.7	4.5	6.1	19.1	25.9	104
Pasco	9.3	12.2	6.1	8.3	14.4	5.9	4.6	1.0	4.9	36.1	2.9	1.0	31.7	23.7	98
Piura	2.0	13.9	6.2	4.8	15.5	9.9	25.4	3.2	1.2	36.6	5.4	7.4	30.2	17.5	808
Puno	8.8	18.6	9.7	9.3	18.6	14.2	10.2	5.8	3.1	31.9	3.5	1.8	26.5	22.6	212
San Martín	15.6	17.1	14.6	39.5	35.6	15.3	10.4	1.6	2.9	26.2	4.3	31.7	27.2	11.4	490
Tacna	3.4	20.6	11.8	12.3	34.2	15.2	15.5	11.5	3.0	28.4	3.9	14.1	27.2	16.4	196
Tumbes	2.2	27.5	20.0	8.0	32.9	9.1	23.8	4.6	1.1	25.4	0.8	20.5	21.1	3.8	197
Ucayali	8.1	13.9	12.4	22.0	13.2	10.2	7.0	3.2	2.4	25.5	2.1	20.1	25.2	20.8	266
Región natural															
Lima Metropolitana	6.9	11.0	10.0	9.3	25.1	14.3	16.4	4.7	2.9	33.9	4.3	6.3	31.5	14.8	5,795
Resto costa	4.7	13.6	10.0	8.4	21.8	14.0	17.9	4.0	1.4	32.3	3.0	7.5	31.4	20.2	3,330
Sierra	7.5	20.3	10.5	8.7	24.1	11.1	11.9	3.3	1.9	30.8	2.1	3.8	27.8	22.8	2,822
Selva	11.5	19.0	12.1	23.6	22.5	12.6	10.3	2.2	2.3	25.5	2.9	24.6	27.8	17.6	1,820
Nivel de urbanización															
Lima Metropolitana	6.9	11.0	10.0	9.3	25.1	14.3	16.4	4.7	2.9	33.9	4.3	6.3	31.5	14.8	5,795
Otras ciudades grandes	7.2	17.0	11.4	11.0	22.4	12.6	14.2	3.7	1.9	32.0	2.8	9.7	32.4	19.7	4,650
Resto urbano	7.5	16.2	11.6	12.8	24.6	15.1	16.5	3.1	1.3	31.3	2.0	11.1	28.4	19.1	1,534
Rural	7.1	18.6	8.1	13.9	22.3	10.5	11.4	2.6	1.9	24.6	3.1	10.4	21.9	23.9	1,788
Nivel de educación															
Sin educación	3.6	15.2	6.1	9.6	17.4	3.6	4.1	0.0	1.1	21.1	0.0	7.3	7.8	41.7	125
Primaria	7.4	13.4	7.9	13.9	20.0	9.0	7.5	1.8	1.2	21.5	2.5	12.3	19.7	29.3	1,571
Secundaria	6.9	12.4	8.5	9.6	20.7	11.1	13.2	3.1	2.0	33.5	3.0	7.8	31.2	19.5	6,902
Superior	7.3	17.8	13.8	11.5	29.0	17.9	20.1	5.7	2.9	32.8	4.1	8.3	32.7	12.3	5,169
Total	7.1	14.6	10.4	10.8	23.7	13.4	15.0	3.9	2.2	31.8	3.4	8.5	30.2	18.1	13,766

1.4 PREVALENCIA DE LAS ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

A las mujeres entrevistadas se les hizo una serie de preguntas para disponer de información que facilite la estimación de la prevalencia de las Enfermedades de Transmisión Sexual. En particular, se les preguntó si en los últimos 12 meses le diagnosticaron alguna enfermedad de transmisión sexual, si había tenido algún flujo o secreción genital, si había tenido llaga o úlceras en sus genitales y, a las que tuvieron alguno de esos problemas, a quien acudió en búsqueda de consejo o tratamiento. El detalle de los resultados por características seleccionadas se presenta en los Cuadros 1.9 y 1.10

Cuadros 1.9 y 1.10

Prevalencia de ETS (Cuadro 1.9)

- En los últimos 12 meses, una cuarta parte de las mujeres entrevistadas que han tenido relaciones sexuales tuvieron una ETS, secreción genital o úlceras genitales. La mayor proporción tuvo flujo o secreción genital (23 por ciento). Menos del uno por ciento tuvo una ETS y un tres por ciento alguna llaga o úlcera en sus genitales.
- Las mayores proporciones de mujeres que tuvieron una ETS o alguno de los síntomas de ETS antes indicados se presentan entre las mujeres de 25-29 años (28 por ciento), entre las mujeres con educación secundaria o más (27 por ciento) y entre las residentes en el área urbana (27 por ciento), en la Sierra, en la Selva (27 por ciento, en cada caso) y en los departamentos de Junín, Cusco y Tumbes, donde dicha proporción es mayor al 40 por ciento.
- La proporción de mujeres que presentó una ETS no muestra mayores diferencias por edad, estado conyugal u otra característica similar, pero si llama la atención el nivel que alcanza en los departamentos de Madre de Dios, Tacna, Ucayali (2 por ciento, en cada caso) y Tumbes (6 por ciento).
- En el caso de la proporción de mujeres que presentaron alguna llaga o úlcera genital, ésta es relativamente más frecuente entre las mujeres que residen en los departamentos de Tacna (6 por ciento) y Lambayeque (7 por ciento).

Fuente de tratamiento de las ETS (Cuadro 1.10)

- Del total de mujeres que tuvieron una ETS o alguno de los síntomas de ETS antes indicados, el 71 por ciento buscó consejo o tratamiento de un médico, curandero o en una o farmacia, siendo más frecuente la búsqueda de un médico para el tratamiento (63 por ciento). Una de cada 10 acudió a algún amigo o pariente y un 16 por ciento de las mujeres no buscó consejo ni tratamiento.

Cuadro 1.9 Prevalencia de enfermedades de transmisión sexual por características seleccionadas

Entre todas las mujeres entrevistadas, porcentaje a quienes se les diagnosticó una ETS en los últimos 12 meses; y entre aquéllas que tuvieron relaciones en los últimos 12 meses, porcentaje con flujo o secreción vaginal y porcentaje que ha tenido alguna llaga o úlcera genital, según características seleccionadas, Perú 2000

Característica	Ha tenido ETS	Flujo vaginal anormal	Úlceras o llagas genitales	ETS, flujo, úlceras o llagas	Número de mujeres
Edad					
15-19	0.3	19.6	2.8	21.1	1,256
20-24	1.6	22.7	2.9	25.5	3,117
25-29	1.0	25.5	3.7	28.0	3,621
30-39	1.0	24.5	3.6	26.8	7,194
40-49	0.5	19.8	3.2	21.7	5,517
Estado conyugal					
Casada o unida	0.9	22.8	3.6	25.1	15,627
Divorc./separada/viuda	1.0	23.8	3.0	25.8	2,236
Soltera, ha tenido relac.	1.1	22.5	2.6	24.6	2,841
Área de residencia					
Urbana	1.1	23.8	3.8	26.5	13,928
Rural	0.4	20.9	2.5	22.2	6,776
Departamento					
Amazonas	0.5	24.7	3.9	26.7	307
Ancash	0.4	18.9	1.2	19.9	793
Apurímac	0.6	18.6	2.4	20.3	294
Arequipa	0.9	26.5	3.6	28.4	910
Ayacucho	0.5	26.2	3.9	28.0	344
Cajamarca	1.0	24.1	3.9	26.9	1,123
Cusco	1.1	40.4	4.1	42.3	898
Huancavelica	0.5	12.7	2.0	14.3	312
Huánuco	0.7	22.0	3.5	24.0	593
Ica	1.0	26.4	3.9	28.9	552
Junín	1.1	38.8	2.0	40.5	989
La Libertad	0.5	12.1	3.7	14.2	1,071
Lambayeque	0.4	21.0	6.8	24.0	948
Lima	1.1	21.2	3.5	23.9	6,755
Loreto	1.1	20.4	1.0	21.8	723
Madre de Dios	1.5	21.6	1.2	23.6	57
Moquegua	0.9	19.7	3.1	21.9	135
Pasco	0.0	33.1	1.8	33.5	187
Piura	0.3	13.1	3.0	14.7	1,474
Puno	0.5	25.2	3.0	26.5	907
San Martín	0.8	27.9	2.9	29.7	590
Tacna	1.7	26.0	6.2	30.8	241
Tumbes	5.5	39.5	4.0	45.5	166
Ucayali	2.1	20.2	2.3	23.2	337
Region natural					
Lima Metropolitana	1.1	21.9	3.7	24.7	6,047
Resto Costa	0.9	18.1	4.1	20.6	5,032
Sierra	0.7	26.2	2.7	27.8	6,966
Selva	1.0	25.4	3.0	27.5	2,658
Nivel de urbanización					
Lima Metropolitana	1.1	21.9	3.7	24.7	6,047
Otras ciudades grandes	1.4	26.0	4.1	29.0	5,589
Resto urbano	0.7	23.5	3.3	25.3	2,292
Rural	0.4	20.9	2.5	22.2	6,776
Nivel de educación					
Sin educación	0.3	17.8	2.5	18.9	1,365
Primaria	0.5	20.9	3.4	22.7	6,944
Secundaria	1.1	24.7	3.7	27.3	8,073
Superior	1.4	24.2	3.0	26.8	4,322
Total	0.9	22.9	3.4	25.1	20,704

- Las mayores proporciones de mujeres que no buscaron consejo ni tratamiento se presentan entre las mujeres solteras (23 por ciento), sin nivel educativo (28 por ciento), las menores de 20 años (34 por ciento) y entre las residentes en los departamentos de Apurímac, Puno y Huancavelica, donde dicha proporción es mayor al 37 por ciento.
- Las proporciones de mujeres que se autorecetaron es más frecuente entre las mujeres de 40-49 años de edad (12 por ciento), sin educación (21 por ciento), entre las residentes en la Sierra (15 por ciento) y en los departamentos de Cusco, Puno y Huanuco, donde la proporción es mayor al 22 por ciento.

Cuadro 1.10 Fuente de tratamiento para las enfermedades de transmisión sexual

Entre las mujeres que tuvieron una ETS, flujo vaginal, úlceras o llagas vaginales en los últimos 12 meses, porcentaje que recibió consejo o tratamientos, por fuente de tratamiento y según características seleccionadas, Perú 2000

Característica	Tipo de consejo o tratamiento				Consultó amigos/parientes	Se auto-recetó	Ni consejo ni tratamiento	Número de mujeres
	Médico	Curandero	Farmacia/Botica	Cualquier fuente				
Edad								
15-19	35.6	4.1	13.1	45.8	10.4	9.6	34.2	265
20-24	59.9	4.8	13.5	67.4	5.2	9.0	18.3	795
25-29	66.9	5.9	13.9	74.1	2.9	8.7	14.3	1,014
30-39	67.1	6.6	13.1	74.8	1.6	9.9	13.8	1,930
40-49	61.3	7.1	15.2	71.8	1.0	12.2	14.9	1,195
Estado conyugal								
Casada o unida	65.3	6.5	13.8	73.1	1.9	10.3	14.7	3,924
Divorciada, separada, viuda	61.7	6.5	15.2	72.6	2.7	9.1	15.7	577
Soltera, ha tenido relaciones	51.2	4.1	12.5	60.7	7.3	9.5	22.5	698
Área de residencia								
Urbana	68.5	4.8	14.9	76.5	2.7	7.5	13.3	3,692
Rural	49.7	9.7	11.2	58.8	2.8	16.3	22.1	1,507
Departamento								
Amazonas	61.1	15.4	27.5	74.5	1.2	9.7	14.6	82
Ancash	62.8	20.0	17.9	77.9	7.6	9.0	5.5	157
Apurímac	48.6	10.4	10.4	56.6	1.7	4.0	37.6	60
Arequipa	69.3	2.1	8.3	72.2	2.9	2.9	22.0	258
Ayacucho	45.7	3.7	6.7	50.2	2.2	17.1	30.5	96
Cajamarca	58.1	10.5	15.7	69.6	3.1	12.6	14.7	302
Cusco	41.9	4.8	10.0	49.0	2.3	22.6	26.1	380
Huancavelica	33.0	4.7	9.4	38.7	8.5	12.3	40.6	45
Huánuco	48.5	6.5	7.5	54.5	5.0	24.5	16.0	142
Ica	69.8	1.0	8.3	74.1	4.4	10.2	11.2	160
Junín	62.4	13.0	15.8	75.8	1.8	12.4	10.0	401
La Libertad	71.3	8.7	11.3	78.3	0.0	7.8	13.9	152
Lambayeque	76.5	5.0	17.3	82.7	1.1	5.6	10.6	227
Lima	71.1	2.1	17.2	79.8	3.1	5.1	12.0	1,614
Loreto	65.4	14.1	18.5	74.1	2.4	10.7	12.7	157
Madre de Dios	77.2	3.3	27.4	83.3	1.4	6.0	9.3	13
Moquegua	73.4	8.5	15.8	79.7	1.7	3.4	15.3	30
Pasco	49.0	15.7	19.5	64.4	7.7	12.3	15.7	62
Piura	66.9	3.0	5.3	72.2	0.8	9.0	18.0	216
Puno	30.1	8.6	4.3	36.7	0.4	23.4	39.5	240
San Martín	72.6	6.5	11.7	79.4	3.2	8.9	8.5	175
Tacna	70.2	7.0	21.4	79.1	2.8	5.1	13.0	74
Tumbes	67.0	2.3	7.6	72.8	2.0	12.0	13.2	76
Ucayali	69.2	9.5	11.4	77.3	0.9	8.5	13.3	78
Región natural								
Lima Metropolitana	70.9	2.3	17.5	79.9	3.0	5.5	11.7	1,494
Resto Costa	72.5	4.8	12.9	78.4	2.7	6.8	12.2	1,038
Sierra	50.8	8.4	10.5	59.7	2.7	14.9	22.7	1,936
Selva	66.1	10.3	16.5	74.9	2.2	11.2	11.6	731
Nivel de urbanización								
Lima Metropolitana	70.9	2.3	17.5	79.9	3.0	5.5	11.7	1,494
Otras ciudades grandes	66.3	6.4	13.3	73.5	3.0	8.3	15.2	1,619
Resto urbano	68.6	6.5	12.7	76.2	1.0	10.4	12.4	580
Rural	49.7	9.7	11.2	58.8	2.8	16.3	22.1	1,507
Nivel de educación								
Sin educación	36.8	7.3	9.4	48.5	2.4	20.7	28.3	258
Primaria	53.5	10.5	15.3	63.6	2.1	14.6	19.7	1,578
Secundaria	66.1	4.6	14.3	74.2	3.4	7.8	14.6	2,206
Superior	76.1	3.1	11.8	81.6	2.3	5.7	10.3	1,157
Total	63.0	6.2	13.8	71.4	2.7	10.1	15.9	5,199

Nota: El cuadro incluye mujeres con una STI, flujo vaginal anormal, úlceras o llagas vaginales en los 12 meses antes de la encuesta. Todos los porcentajes están basados en más de 25 casos sin ponderar.

1.5 CONDUCTA SEXUAL, USO DEL CONDÓN Y ACCESO AL CONDÓN

La conducta sexual individual y el uso de condones son determinantes claves del estatus de riesgo de contraer ETS y cuando esta información se agrega a nivel de la población permite describir el contexto en el cual se deben diseñar e implementar los programas preventivos de VIH/SIDA y ETS, al igual que los programas curativos de ETS y de alivio de VIH/SIDA. En la ENDES 2000 se preguntó a las mujeres por relaciones sexuales en los últimos 12 meses, número de parejas sexuales, uso de condón en la última relación y conocimiento de fuentes. Se trató también de conocer la relación de la mujer con la persona con quien tuvo la relación para distinguir la pareja sexual regular de la no regular, cohabitante o no. Los resultados se detallan en los Cuadros 1.1 a 1.13.

Cuadros 1.11 a 1.13; y Gráfico 1.3

Número de parejas sexuales de las mujeres no en unión (Cuadro 1.11)

- La mayoría de las mujeres no unidas (61 por ciento) no ha tenido relaciones sexuales en los últimos 12 meses y entre las que tuvieron relaciones sexuales la mayoría las tuvo con una sola persona (38 por ciento). Menos del uno por ciento (0.3) las tuvo con dos o mas personas.
- Las mujeres no unidas que tuvieron relaciones sexuales con dos o más personas es más frecuente entre las con educación primaria o más (0.3 por ciento) entre las mujeres de 20-24 años de edad (0.5 por ciento) y entre las solteras sexualmente activas (1 por ciento). En los departamentos de Madre de Dios, Pasco y Ucayali, dicho porcentaje es igual o mayor al 1.1 por ciento.

Conocimiento y uso del condón (Cuadro 1.12)

- Casi todas las mujeres que conocen sobre el VIH/SIDA y tuvieron relaciones sexuales durante los últimos doce meses conoce el condón masculino (98 por ciento), porcentaje de mujeres que es similar en casi todos los grupos y ámbitos poblacionales, con la sola excepción de la mujeres sin educación entre las cuales dicha proporción disminuye al 79 por ciento.
- De manera similar pero en menor nivel, la mayoría de las mujeres que conoce el condón sabe donde adquirirlo (89 por ciento). Solo un 11 por ciento de las mujeres que conocen sobre el VIH/SIDA y tuvieron relaciones sexuales durante los últimos doce no conoce donde puede obtenerlo, proporción que es mayor entre las mujeres sin educación (47 por ciento.). En los departamentos de Cajamarca, Ayacucho, Cusco, Amazonas y Ancash, dicha proporción es igual o mayor al 22 por ciento.
- Los establecimientos de salud del sector público son las fuentes de abastecimiento que una mayor proporción de las mujeres declara conocer (65 por ciento). En menor orden, mencionan la Farmacia (58 por ciento).
- Sólo el 8 por ciento de las mujeres que conocen sobre el VIH/SIDA y tuvieron relaciones sexuales durante los últimos doce meses, usaron en la última relación que tuvieron: 6 por ciento el mes pasado y 2 por ciento en los meses anteriores. Cerca del uno por ciento de estas mujeres usa el condón como método de planificación familiar pero no lo usó en su última relación sexual.

Uso de condón en los últimos doce meses según tipo de compañero (Cuadro 1.13 y Gráfico 1.3)

- Con relación al uso del condón, solamente el 7 por ciento de las mujeres alguna vez unidas usaron el condón en la última relación que tuvieron y este porcentaje se incrementa a 18 por ciento entre las mujeres que el compañero no vive con ella. Este porcentaje hace que el nivel de uso entre las mujeres que tuvieron relaciones sexuales durante los últimos doce meses se incremente al 8 por ciento.
- El uso del condón es mas frecuente entre las más mujeres de 25-29 años de edad (11 por ciento), entre las mujeres con educación superior (15 por ciento) y entre las solteras (20 por ciento). Sin considerar Lima Metropolitana (13 por ciento), en los departamentos de Arequipa, Junín y Moquegua, el porcentaje de usuarias varía entre el 10 y el 11 por ciento.

Cuadro 1.11 Número de parejas sexuales de las mujeres no en unión

Distribución porcentual de mujeres no en unión por número de personas con quienes han tenido relaciones sexuales en los últimos 12 meses, según características seleccionadas, Perú 2000

Característica	Número de compañeros sexuales			Total	Promedio de parejas	Número de mujeres
	Ninguno	Uno	Dos o más			
Edad						
11-19	87.3	12.5	0.2	100.0	0.1	5,063
20-24	61.7	37.8	0.5	100.0	0.4	2,769
25-29	46.0	53.6	0.4	100.0	0.6	1,489
30-39	29.2	70.5	0.4	100.0	0.7	1,690
40-49	16.1	83.7	0.2	100.0	0.8	1,203
Estado conyugal						
Divorciada, separada, viuda	15.3	84.2	0.4	100.0	0.9	2,236
Soltera, ha tenido relaciones	0.7	98.3	1.0	100.0	1.0	2,841
Soltera/no ha tenido relaciones	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	7,137
Área de residencia						
Urbana	61.1	38.5	0.3	100.0	0.4	9,461
Rural	62.3	37.5	0.2	100.0	0.4	2,754
Departamento						
Amazonas	52.3	47.7	0.0	100.0	0.5	116
Ancash	58.7	41.0	0.3	100.0	0.4	418
Apurímac	62.9	37.1	0.0	100.0	0.4	101
Arequipa	57.4	42.4	0.2	100.0	0.4	573
Ayacucho	54.3	45.7	0.0	100.0	0.5	175
Cajamarca	65.6	34.0	0.3	100.0	0.3	515
Cusco	59.5	40.2	0.3	100.0	0.4	411
Huancavelica	60.9	39.1	0.0	100.0	0.4	123
Huánuco	53.4	46.3	0.2	100.0	0.5	291
Ica	67.4	32.6	0.0	100.0	0.3	375
Junín	61.9	37.5	0.6	100.0	0.4	589
La Libertad	65.4	34.4	0.2	100.0	0.4	673
Lambayeque	70.2	29.6	0.2	100.0	0.3	605
Lima	60.0	39.6	0.4	100.0	0.4	4,824
Loreto	38.3	60.9	0.8	100.0	0.6	282
Madre de Dios	43.0	55.3	1.8	100.0	0.7	21
Moquegua	60.6	39.1	0.2	100.0	0.4	68
Pasco	58.4	40.5	1.1	100.0	0.4	114
Piura	74.2	25.8	0.0	100.0	0.3	896
Puno	70.2	29.8	0.0	100.0	0.3	438
San Martín	50.5	48.8	0.7	100.0	0.5	214
Tacna	58.0	42.0	0.0	100.0	0.4	152
Tumbes	72.4	27.4	0.2	100.0	0.3	99
Ucayali	35.9	62.8	1.3	100.0	0.7	141
Región natural						
Lima Metropolitana	60.6	39.0	0.4	100.0	0.4	4,458
Resto Costa	67.3	32.6	0.1	100.0	0.3	3,184
Sierra	61.4	38.3	0.2	100.0	0.4	3,523
Selva	47.0	52.4	0.6	100.0	0.5	1,050
Nivel de urbanización						
Lima Metropolitana	60.6	39.0	0.4	100.0	0.4	4,458
Otras ciudades grandes	61.9	37.8	0.3	100.0	0.4	3,682
Resto urbano	61.1	38.7	0.2	100.0	0.4	1,321
Rural	62.3	37.5	0.2	100.0	0.4	2,754
Nivel de educación						
Sin educación	30.1	69.8	0.1	100.0	0.7	281
Primaria	51.5	48.2	0.3	100.0	0.5	2,207
Secundaria	68.8	30.8	0.3	100.0	0.3	6,516
Superior	55.8	43.8	0.3	100.0	0.4	3,211
Total	61.4	38.3	0.3	100.0	0.4	12,215

Cuadro 1.12 Conocimiento y uso del condón

Entre las mujeres que conocen sobre VIH/SIDA y que han tenido relaciones sexuales, porcentaje que conoce el condón masculino, porcentaje que conoce una fuente para condón, porcentaje que usó durante la última relación, y porcentaje que usó condón para planificación familiar pero no durante la última relación, según características seleccionadas, Perú 2000

Característica	Conoce sobre el condón ¹	Conoce fuente para el condón ²					No conoce fuente para el condón	Usó condón última relación		Usa condón para PF; no usó en última relación	Número de mujeres
		Fuente médica pública	Fuente médica privada	Farmacia	Otra fuente	Podría conseguir condones		El mes pasado	Antes		
Edad											
15-19	96.4	64.6	2.3	46.0	5.9	41.1	17.8	4.4	3.5	0.6	1,007
20-24	98.4	70.6	3.7	60.5	5.4	53.4	8.0	5.7	4.4	0.8	2,666
25-29	98.4	70.3	3.5	60.6	5.0	56.9	7.8	7.7	2.6	1.2	3,186
30-39	98.0	66.8	3.3	58.3	5.0	56.0	9.2	6.0	1.1	1.1	6,231
40-49	96.0	56.4	3.6	57.7	7.7	49.0	15.5	4.4	1.3	0.6	4,711
Estado conyugal											
Casada o unida	97.4	66.7	3.0	55.3	4.9	53.5	11.1	6.3	0.9	0.9	13,205
Divorciada, separada, viuda	97.9	61.6	3.1	62.9	6.6	50.4	11.9	1.4	3.7	0.2	1,993
Soltera, ha tenido relaciones	97.9	59.6	5.8	69.5	9.8	53.2	9.1	6.1	6.6	1.1	2,602
Área de residencia											
Urbana	99.0	62.8	4.2	70.3	7.3	58.2	7.3	6.6	2.5	1.0	13,488
Rural	93.0	72.4	1.0	20.3	1.1	36.9	22.3	3.0	0.6	0.5	4,311
Departamento											
Amazonas	94.5	72.8	1.0	26.6	2.1	30.1	22.1	2.9	1.1	0.4	267
Ancash	93.9	61.0	4.8	41.6	4.0	44.7	20.3	4.6	1.5	0.6	571
Apurímac	93.1	88.3	1.0	21.9	0.2	39.5	11.1	5.3	2.2	0.4	170
Arequipa	98.6	71.3	3.8	64.4	7.9	63.3	7.3	6.0	2.8	3.1	840
Ayacucho	93.5	69.2	1.1	24.6	1.4	39.8	24.7	4.5	0.8	0.8	230
Cajamarca	90.0	65.6	0.9	18.8	0.7	32.4	29.5	5.3	0.9	1.1	712
Cusco	95.5	66.8	5.6	38.6	1.3	46.1	22.2	4.5	1.9	1.5	568
Huancavelica	96.1	85.5	1.0	29.4	1.6	54.2	12.6	2.6	1.0	1.3	130
Huánuco	92.9	77.0	0.6	29.5	2.7	55.6	13.3	4.8	0.6	0.2	369
Ica	99.6	67.4	4.0	69.1	9.4	61.3	7.6	6.2	2.1	0.7	530
Junín	97.5	74.7	1.5	47.1	0.8	55.1	14.3	7.5	1.9	0.4	874
La Libertad	96.6	68.5	3.8	61.8	5.4	44.0	10.7	4.1	1.6	1.1	937
Lambayeque	96.2	47.6	2.6	57.3	1.6	39.4	16.4	4.6	1.0	0.7	865
Lima	99.3	54.9	4.2	78.3	10.2	61.2	6.0	7.7	2.9	0.9	6,651
Loreto	97.6	85.4	3.0	39.4	5.3	54.8	10.9	2.1	2.2	0.5	636
Madre de Dios	98.5	77.6	1.6	50.3	2.3	50.7	10.6	4.9	1.6	0.9	47
Moquegua	98.7	87.0	2.4	45.8	0.8	69.7	5.6	9.0	0.9	0.3	125
Pasco	97.0	85.7	1.7	42.8	0.8	42.3	8.8	3.3	1.8	0.3	158
Piura	97.3	66.4	1.1	55.3	2.6	47.9	11.6	3.2	1.0	0.6	1,326
Puno	96.2	78.5	7.7	21.5	0.9	30.7	16.3	2.7	1.1	0.7	522
San Martín	98.6	85.3	1.9	39.6	4.4	51.8	8.7	4.2	1.8	0.4	561
Tacna	99.2	83.8	7.6	66.8	4.1	61.0	6.4	5.6	2.0	1.7	228
Tumbes	99.3	85.5	7.0	53.2	0.3	60.7	3.5	5.9	0.7	0.7	165
Ucayali	99.4	81.0	1.5	47.1	1.7	53.4	6.7	3.7	1.8	0.5	315
Región natural											
Lima Metropolitana	99.5	53.3	4.5	82.4	11.2	63.5	5.2	8.3	3.1	0.9	5,985
Resto Costa	98.1	64.9	3.2	60.2	3.9	49.4	10.6	4.5	1.6	0.8	4,772
Sierra	94.4	72.6	3.1	35.2	2.2	45.3	17.9	4.9	1.3	1.2	4,700
Selva	97.6	80.8	1.8	38.5	3.3	49.5	12.5	3.6	1.8	0.4	2,341
Nivel de urbanización											
Lima Metropolitana	99.5	53.3	4.5	82.4	11.2	63.5	5.2	8.3	3.1	0.9	5,985
Otras ciudades grandes	98.7	68.4	4.5	64.1	4.7	56.5	8.8	5.6	2.1	1.3	5,379
Resto urbano	98.2	75.2	2.4	52.1	3.1	47.9	9.5	4.5	2.2	0.5	2,124
Rural	93.0	72.4	1.0	20.3	1.1	36.9	22.3	3.0	0.6	0.5	4,311
Nivel de educación											
Sin educación	79.0	46.8	0.7	13.1	0.9	17.8	47.3	1.2	0.1	0.3	543
Primaria	94.4	65.6	1.0	32.6	2.2	36.2	22.3	3.0	0.6	0.3	5,106
Secundaria	99.5	67.4	2.8	66.6	5.6	56.5	6.3	5.8	2.3	0.9	7,835
Superior	100.0	62.8	7.7	79.0	11.2	71.3	1.3	9.3	3.6	1.6	4,316
Total	97.5	65.1	3.4	58.2	5.8	53.1	10.9	5.7	2.1	0.9	17,800

¹ Conocimiento para planificación familiar o para prevención de enfermedades

² Para las usuarias actuales se incluye como fuente el último sitio donde obtuvo el condón

Cuadro 1.13 Uso de condón por tipo de compañero

Entre las mujeres que tuvieron relaciones sexuales el año anterior a la encuesta, porcentaje que usaron condón en la última relación con el esposo o compañero, con compañero con quien no vive, y con cualquier compañero, según características seleccionadas, Perú 2000

Característica	Usó condón con esposo o compañero		Usó con compañero con quien no vive		Usó condón con cualquier compañero	
	Porcentaje	Número de mujeres	Porcentaje	Número de mujeres	Porcentaje	Número de mujeres
Edad						
15-19	3.2	594	15.0	441	8.3	1,030
20-24	5.9	2,004	22.2	629	9.8	2,630
25-29	8.2	2,770	24.3	446	10.5	3,206
30-39	6.7	5,877	12.1	499	7.1	6,360
40-49	6.1	4,222	10.7	198	6.3	4,414
Estado conyugal						
Casada o unida	6.6	15,181	13.2	57	6.6	15,204
Divorciada, separada, viuda	8.1	266	13.0	586	11.6	848
Soltera, ha tenido relaciones	13.8	18	19.8	1,570	19.8	1,588
Área de residencia						
Urbana	8.7	9,915	19.6	1,879	10.4	11,760
Rural	2.9	5,551	8.1	334	3.2	5,879
Departamento						
Amazonas	3.0	246	16.2	23	4.1	268
Ancash	5.1	591	7.2	75	5.4	666
Apurímac	4.2	249	28.6	14	5.5	263
Arequipa	8.3	641	20.4	105	10.1	745
Ayacucho	4.9	251	7.0	31	5.1	281
Cajamarca	4.4	924	23.5	54	5.5	978
Cusco	4.2	703	10.9	78	4.9	779
Huancavelica	2.1	255	8.1	16	2.5	270
Huánuco	3.4	442	11.0	58	4.3	499
Ica	8.1	422	17.1	55	9.2	476
Junín	8.0	747	27.8	87	10.0	834
La Libertad	4.7	810	18.8	91	6.0	900
Lambayeque	5.0	742	12.9	79	5.7	819
Lima	10.5	4,668	20.4	1,013	12.3	5,664
Loreto	2.0	533	14.9	118	4.4	649
Madre de Dios	4.6	44	16.1	7	6.1	51
Moquegua	10.3	107	21.0	10	11.1	117
Pasco	4.2	136	14.5	18	5.5	154
Piura	3.8	1,196	12.5	91	4.4	1,281
Puno	3.2	734	13.8	27	3.6	761
San Martín	4.5	475	18.6	61	6.1	536
Tacna	7.4	174	15.9	30	8.6	204
Tumbes	7.2	134	11.1	10	7.5	144
Ucayali	4.6	242	9.8	61	5.7	301
Región natural						
Lima Metropolitana	11.3	4,151	21.3	935	13.1	5,070
Resto Costa	5.8	3,862	15.3	479	6.8	4,332
Sierra	4.6	5,399	16.0	473	5.5	5,866
Selva	3.8	2,054	14.5	326	5.3	2,372
Nivel de urbanización						
Lima Metropolitana	11.3	4,151	21.3	935	13.1	5,070
Otras ciudades grandes	7.3	4,042	16.8	716	8.7	4,751
Resto urbano	5.5	1,722	21.4	227	7.4	1,939
Rural	2.9	5,551	8.1	334	3.2	5,879
Nivel de educación						
Sin educación	1.4	1,105	8.0	29	1.5	1,129
Primaria	3.5	5,625	5.8	332	3.6	5,950
Secundaria	7.7	5,886	17.2	1,033	9.1	6,904
Superior	12.5	2,849	24.0	819	15.0	3,657
Total	6.6	15,466	17.9	2,213	8.0	17,640

Gráfico 1.3
Uso de Condón según Tipo de Compañero
por Lugar de Residencia y Educación

